

دراسة استرجاعية لحالات تمزق الرحم بمركز الرعاية الثالثية في مصر

د. ليلى عزت اد / محمد صلاح
قسم أمراض النساء والتوليد - طب أسوان

الملخص العربي

مقدمة

تمزق الرحم هو واحد من أخطر حالات الطوارئ أثناء الولادة التي تستلزم التشخيص والعلاج الفوريين ، حيث أنها قد تؤدي إلى فقد حياة الأم والجنين. قد يحدث تمزق الرحم(ندوب في أي مرحلة من مراحل الحمل في البلدان المتقدمة ، مع الرعاية الجيدة السابقة للولادة والإشراف الجيد أثناء الولادة ، أصبحت حالات تمزق الرحم نادرة الحدوث

الهدف من الدراسة هو معرفة عوامل الخطر التي قد تؤدي إلى حدوث تمزق الرحم وكذلك ، المضاعفات ذات الصلة وما يرتبط بها من نتائج الأمهات والجنين مع تمزق الرحم

أسلوب الدراسة

دراسة استرجاعية تعتمد على أخذ ملفات البيانات وملحوظات الحالة من قسم السجلات الطبية بأسوان المستشفى الجامعي من ١ يناير ٢٠١٣ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣. في شكل بيانات تتبع بالعمر ، التكافؤ ، عمر الحمل ، طريقة الابتهاء ، ونتائج ما قبل الولادة ، وما يتصل بها من مضاعفات الأمهات

النتائج

كان هناك ٤٢٨ ولادة خلال الفترة قيد الاستعراض من بينها ٥ حالات تمزق الرحم. وهذا كان معدل حدوث تمزق الرحم هو ١.١٪ / ١٠٠٠ ولادة. (٣٪) من الحالات (٦٠٪) لم تكن لديهم رعاية سابقة للولادة في أي مستشفى أو مركز رعاية أولية. عوامل الخطر في هذه الحالات هي في الأغلبية ٤٪ (٨٠٪) من حالات تمزق الرحم وقعت في النساء مع النوبة السابقة ، ١٪ (٢٠٪) من حالات تمزق الرحم وقعت في النساء مع أي رحم مشوه. فيما يتعلق بالإدارة الجراحية ٣ حالات

تدار عن طريق استئصال الرحم و ٢٪ (٤٠٪) تدار من قبل تصليح الرحم ، فيما يتعلق بالنتيجة الأمومية (٦٠٪) والجينينية ، تحتاج جميع النساء إلى نقل الدم. تم إصلاح إصابة المثانة بتمزق في حالتين (٤٪). بعد استبعاد هر الجينين قبل عمر الجنين ، كان معدل الوفيات في الفترة المحيطة بالولادة ١٠٠٪ (٥٪)

الاستنتاجات

خلصت الدراسة التحليلية باشر رجعي إلى أن تمزق الرحم هو حالة ولادة طارئة مهددة للحياة. وإن الرعاية الصحيحة قبل الولادة وأثناء الولادة ، وتحديد عوامل الخطر العالية ، وتشجيع المواقبة على الولادة والولادة المؤسسة هي عوامل رئيسية في الحد والتشخيص المبكر